

化学療法治療レジメン

申請書 <主治医> → <薬剤部> → <化学療法委員会>
 計画書 <主治医> → <薬剤部>

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	胃-4 サイラムザ + PAC	総投与時間：約100-170分
申請医：南條 成輝Dr	催吐性リスク：最小-軽度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	サイラムザ(RAM)	div	8mg/kg	D1,15	4週間
	パクリタキセル(PAC)		80mg/m ²		
対象(適応癌種)	治癒切除不能な進行・再発の胃癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 6.6mg(適宜漸減) ポララミン 1A シメチジン 1A 生食 50mL	div (ケモセーフイルター付き)	500 mL/hr			D1,15
Rp2	生食 50mL		100 mL/hr			
Rp3	サイラムザ【 mg/body】 生食 (250- mL) = 【 mL】 ※サイラムザ(100mg/10mL)の注入分(mL)の生食をあらかじめ抜き取る。		250 mL/hr	8 mg/kg	mg/body	
Rp4	生食 50mL		500 mL/hr			
Rp5	パクリタキセル【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		250 mL/hr			
Rp6	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr			

Rp1	デキサート 6.6mg(適宜漸減) ポララミン 1A ザンタック 1A 5%ブドウ糖 50mL	div (ケモセーフイルター付き)	500 mL/hr			D8
Rp2	5%ブドウ糖 100mL		200 mL/hr			
Rp3	パクリタキセル【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		250 mL/hr	80 mg/m ²	mg/body	
Rp4	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr			

RAM/PAC