

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉
〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	胃-14 XP	総投与時間：約5.5時間
申請医：中島 日出夫Dr	催吐性リスク：高度	最新登録日：2021年 8月

薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール	
カペシタビン：D1-D14	1日2回、朝夕食後30分以内に服用	体表面積(m ²)	1回用量(錠数)	1日錠数	3週間
		1.36未満	1200mg(4錠)	8錠/分2	
		1.36以上1.66未満	1500mg(5錠)	10錠/分2	
		1.66以上1.96未満	1800mg(6錠)	12錠/分2	
		1.96以上	2100mg(7錠)	14錠/分2	
シスプラチン(CDDP)	div	80mg/m ²	D1		
対象(適応癌種)	治癒切除不能な進行・再発の胃癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg(適宜減量) グラニセトロン 1A メイロン 0.5A ソルデム3A 500mL	div (ケモセーフ)	500 mL/hr	[Diagonal shading]		D1
Rp2	マンニトール 300mL					
Rp3	シスプラチン【 mg/body】 生食【 mL】 (Total 500mL)					
Rp4	生食 500mL			[Diagonal shading]		
Rp5	ソルデム3A 500mL					
Rp6	プリンペラン 1A ソルデム3A 500mL					
Rp7	カペシタビン(300)【 】錠/分2 (- 0 -)朝・夕食後 ※D1のカペシタビンは当日の夕食後より服用			1日2回、朝夕食後30分以内に服用		
	体表面積(m ²)	1回用量(錠数)	1日錠数			
	1.36未満	1200mg(4錠)	8錠/分2			
	1.36以上1.66未満	1500mg(5錠)	10錠/分2			
	1.66以上1.96未満	1800mg(6錠)	12錠/分2			
	1.96以上	2100mg(7錠)	14錠/分2			