

化学療法治療レジメン

申請書 (主治医) → (薬剤部) → (化学療法委員会)
 計画書 (主治医) → (薬剤部)

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名 :	胃-19 オプジーボ+SOX	総投与時間 : 約3.2時間
申請医 : 竹内 伸司Dr	催吐性リスク : 中等度	最新登録日 : 2022年 1月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
/	オプジーボ	div	360mg/body	D1	3週間
	オキサリプラチン(L-OHP)	div	100mg/m ²		
	S-1 : D1-D14 1日2回、朝夕食後に服用				
	体表面積(m ²)	1回用量(錠数)	1日錠数		
	1.25未満	40mg(2錠)	4錠/分2		
	1.25以上1.5未満	50mg(2 or 3錠)	5錠/分2(3-0-2)		
	1.5以上	60mg(3錠)	6錠/分2		
対象(適応癌種)	治癒切除不能な進行・再発の胃癌				
コメント	<ul style="list-style-type: none"> ・HER2陰性例に対し、本レジメンを使用すること。 ・重度のInfusion reaction を発現することがあるため、投与中及び投与終了後少なくとも1時間は観察期間(バイタルサインをモニターするなど)を設けること。 				

治療予定期間: 年 月 日 より の間				薬剤師	薬剤師	
処方医師 :		適応癌種 :				
患者ID :		備考:		身長: cm	体表面積:	
患者氏名 :				体重: kg	m ²	
薬品名 【 投与量 】		投与方法	投与速度	標準投与量	計算量 mg/body	投与日
Rp1	生食 50mL	div (ケモセーフ フィルター 付)	500 mL/hr			D1
Rp2	オブジーボ【 360 mg/body 】 生食 100mL		200 mL/hr	360 mg/body	360 mg/body	
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr			
Rp4	デキサート 16.5mg(適宜減量) グラニセトロン 1A 5%ブドウ糖 100mL		250 mL/hr			
Rp5	オキサリプラチン【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		125 mL/hr	100 mg/m ²	mg/body	
Rp6	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr			
Rp7	エスワンタイホウ(20) 【 】錠/分2 (- 0 -) 朝・夕食後		1日2回、朝夕食後に服用			
		体表面積(m ²)	1回用量(錠数)	1日錠数		
		1.25未満	40mg(2錠)	4錠/分2		
		1.25以上1.5未満	50mg(2 or 3錠)	5錠/分2(3-0-2)		
		1.5以上	60mg(3錠)	6錠/分2		