

化学療法治療レジメン

申請書 (主治医) → (薬剤部) → (化学療法委員会)
 計画書 (主治医) → (薬剤部)

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名 :	悪性黒色腫-4 ダカルバジン (1回投与法)	総投与時間 : 約1時間30分
申請医 : 佐藤 成樹Dr	催吐性リスク : 高度	最新登録日 : 2022年 9月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ダカルバジン(DTIC)	div	800~1000 mg/m ²	D1	3~4週間
対象(適応癌種)	悪性黒色腫				
コメント	・ダカルバジンによる血管痛予防のため、点滴経路全般を遮光して投与する。				
投与基準	臨床試験などに記載なし				
減量基準	臨床試験などに記載なし				
主な副作用	ダカルバジン : 悪心・嘔吐、血管痛、肝機能障害、食欲不振				
参考文献	ダカルバジン添付文書 がん化学療法ワークシート第4版 p166~170 エビデンスに基づいた癌化学療法ハンドブック2012 p470~472				

治療予定期間: 年 月 日 より		の間		薬剤師	薬剤師
処方医師 :		適応癌種 :			
患者ID :	年齢 :	備考:	身長: cm	体表面積 :	
患者氏名 :			体重: kg	m ²	
薬品名 【 投与量 】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1 デキサート 9.9mg (適宜減量) グラニセトロン 1A 生食 100mL アプレピタント使用	div (ケモセーフ)	250 mL/hr			D1
Rp2 ダカルバジン【 mg/body】 溶解用注射用水(mL) 1Vにつき 10mL 生食 250mL ※点滴瓶・ルートとも遮光必要		300 mL/hr	800~1000 mg/m ²	mg/body	
Rp3 生食 50mL		500 mL/hr			

ダカルバジン(1日投与法)