

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	大腸-1 アバスチン + mFOLFOX6	総投与時間：約3.5-4.5時間+46時間
申請医：木場 崇剛Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	アバスチン	div	5mg/kg	D1	2週間
	オキサリプラチン(L-OHP)		85mg/m ²		
	レボホリナート(I-LV)		200mg/m ²		
	5-FU		400mg/m ²		
	5-FU	46hr ci	2400mg/m ²	D1-3	
対象(適応癌種)	治癒切除不能・再発大腸癌				

	薬品名 【 投与量 】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日	
Rp1	デキサート 16.5mg(適宜減量) グラニセトロン 1A 生食 100mL	div (ケモセーフ)	250 mL/hr			D1	
Rp2	アバスチン【 mg】 生食 100mL		初回 60mL/hr 2回目 100mL/hr 3回目以降 200mL/hr				5 mg/kg
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr				
Rp4	(側管) レボホリナート【 mg/body】 5%ブドウ糖液 250mL Rp5と同時に		125 mL/hr				200 mg/m ²
Rp5	オキサリプラチン【 mg/body】 5%ブドウ糖液 250mL			85 mg/m ²	mg/body		
Rp6	5-FU【 mg/body】 5%ブドウ糖 50mL			500 mL/hr	400 mg/m ²		mg/body
Rp7	5-FU【 mg/body】 生食【 mL】 デキサート 1.65mg(1A) (SV-2.5使用)		ci	46hr	2400 mg/m ²		mg/body