

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉  
 〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	大腸-4 アバスチン + FOLFIRI	総投与時間：4.5-3.5時間 + 46時間
申請医：木場 崇剛Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
/	アバスチン	div	5mg/kg	D1	2週間
	イリノテカン(CPT-11)		150mg/m <sup>2</sup>		
	レボホリナート(I-LV)		200mg/m <sup>2</sup>		
	5-FU		400mg/m <sup>2</sup>		
	5-FU	46hr ci	2400mg/m <sup>2</sup>	D1-3	
対象(適応癌種)	治癒切除不能・再発大腸癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg(適宜増減) グラニセトロン 1A 生食 100mL	div (ケモセーフ)	250 mL/hr	/		D1
Rp2	アバスチン【 mg】 生食 100mL		初回 60mL/hr 2回目 100mL/hr 3回目以降 200mL/hr	5 mg/kg	mg/body	
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr	/		
Rp4	レボホリナート【 mg/body】 5%ブドウ糖液 250mL (側管)Rp5と同時に		125 mL/hr	200 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp5	イリノテカン【 mg/body】 5%ブドウ糖液 250mL			150 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp6	5-FU【 mg/body】 5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr	400 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp7	5-FU【 mg/body】 生食【 mL】 デキサート 1.65mg(1A) (SV-2.5使用)	ci	46hr	2400 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	D1-D3