

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉  
〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	大腸-5 アバスチン + IRIS	総投与時間：約2.6-3.6時間
申請医：矢野 聖二Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール	
/	アバスチン	div	5mg/kg	D1,15	4週間	
	イリノテカン(CPT-11)		125mg/m <sup>2</sup>			
	S-1 : D1-D14			1日2回、朝夕食後に服用		
				体表面積(m <sup>2</sup> )		1回用量(錠数)
			1.25未満	40mg(2錠)	4錠/分2	
			1.25以上1.5未満	50mg(2 or 3錠)	5錠/分2(3-0-2)	
			1.5以上	60mg(3錠)	6錠/分2	
対象(適応癌種)	大腸癌					

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg (適宜増減) グラニセトロン 1A 生食 100mL	div (ケモ セーフ)	250 mL/hr			D1,15
Rp2	アバスチン【 mg】 生食 100mL		初回 60mL/hr 2回目 100mL/hr 3回目以降 200mL/hr	5 mg/kg	mg/body	
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr			
Rp4	イリノテカン【 mg/body】 5%ブドウ糖 500mL		330 mL/hr	125 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp5	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr			
Rp6	エスワンタイハウ(20)【 錠/分2 ( - 0 - ) 朝・夕食後 ※D1のS-1は当日の夕食後より服用	1日2回、朝夕食後に服用			D1-14	
		体表面積(m <sup>2</sup> )	1回用量(錠数)	1日錠数		
		1.25未満	40mg(2錠)	4錠/分2		
		1.25以上1.5未満	50mg(2 or 3錠)	5錠/分2(3-0-2)		
		1.5以上	60mg(3錠)	6錠/分2		