

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	大腸-6 アバスチン + modified-FOLFOXIRI (導入)	総投与時間：約4-5時間 + 46時間
申請医：谷本 梓Dr	催吐性リスク：高度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	アバスチン	div	5mg/kg	D1	2週間
	オキサリプラチン(L-OHP)		85mg/m <sup>2</sup>		
	イリノテカン(CPT-11)		150mg/m <sup>2</sup>		
	レボホリナート(I-LV)		200mg/m <sup>2</sup>		
	5-FU	46hr ci	2400mg/m <sup>2</sup>	D1-3	
対象(適応癌種)	治癒切除不能・再発大腸癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg(適宜減量) グラニセトロン 1A 生食 100mL アプレピタント使用	div (ケモセーフ)	250 mL/hr			D1
Rp2	アバスチン【 mg】 生食 100mL		初回 60mL/hr 2回目 100mL/hr 3回目以降 200mL/hr			
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr			
Rp4	イリノテカン【 mg/body】 5%ブドウ糖液 250mL		250 mL/hr			
Rp5	(側管) レボホリナート【 mg/body】 5%ブドウ糖液 250mL		125 mL/hr	200 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp6	オキサリプラチン【 mg/body】 5%ブドウ糖液 250mL ※Rp5と並行して投与		125 mL/hr	85 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp7	5-FU【 mg/body】 生食【 mL】 デキサート 1.65mg(1A) (SV-2.5使用)	ci	46hr	2400 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	D1-D3