

化学療法治療レジメン

申請書 (主治医) → (薬剤部) → (化学療法委員会)
 計画書 (主治医) → (薬剤部)

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名 :	大腸-12 ベクティビックス + mFOLFOX6	総投与時間 : 約4時間 + 46時間			
申請医 : 島崎 猛夫Dr	催吐性リスク : 中等度	最新登録日 : 2021年 8月			
	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
/	ベクティビックス	div	6mg/kg	D1	2週間
	オキサリプラチン(L-OHP)		85mg/m ²		
	レボホリナート(I-LV)		200mg/m ²		
	5-FU		400mg/m ²		
	5-FU	46hr ci	2400mg/m ²	D1-3	
対象(適応癌種)	KRAS遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌				

	薬品名 【 投与量 】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 16.5mg(適宜減量) グラニセトロン 1A 生食 100mL	div (ケモセーフ フィルター付 き)	250 mL/hr	/		D1
Rp2	ベクティビックス【 mg/body】 生食 100mL		100 mL/hr	6 mg/kg	mg/body	
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr	/		
Rp4	(側管) レボホリナート【 mg/body】 5%ブドウ糖液 250mL Rp5と同時に		125 mL/hr	200 mg/m ²	mg/body	
Rp5	オキサリプラチン【 mg/body】 5%ブドウ糖液 250mL			85 mg/m ²	mg/body	
Rp6	5-FU【 mg/body】 5%ブドウ糖 50mL			400 mg/m ²	mg/body	
Rp7	5-FU【 mg/body】 生食【 mL】 デキサート 1.65mg(1A) (SV-2.5使用)		ci	46hr	2400 mg/m ²	