

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	大腸-21 CapeOX	総投与時間：約2.5時間
申請医：矢野 聖二Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
オキサリプラチン(L-OHP)	div	130mg/m ²	D1	3週間
カペシタビン：D1-D14 1日2回、朝夕食後30分以内に服用				
	体表面積(m ²)	1回用量(錠数)	1日錠数	
	1.36未満	1200mg(4錠)	8錠/分2	
	1.36以上1.66未満	1500mg(5錠)	10錠/分2	
	1.66以上1.96未満	1800mg(6錠)	12錠/分2	
	1.96以上	2100mg(7錠)	14錠/分2	
対象(適応癌種)	①治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌、結腸癌術後補助化学療法 ②治癒切除不能な進行・再発の胃癌、胃癌術後補助化学療法			

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 16.5mg(適宜減量) グラニセトロン 1A 5%ブドウ糖液 100mL	div (ケモセーフ)	250 mL/hr			D1
Rp2	オキサリプラチン【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		125 mL/hr			
Rp3	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr			
Rp4	カペシタビン(300)【 】錠/分2 (- 0 -)朝・夕食後 ※D1のカペシタビンは当日の夕食後より服用	1日2回、朝夕食後30分以内に服用			D1-14	
		体表面積(m ²)	1回用量(錠数)	1日錠数		
		1.36未満	1200mg(4錠)	8錠/分2		
		1.36以上1.66未満	1500mg(5錠)	10錠/分2		
		1.66以上1.96未満	1800mg(6錠)	12錠/分2		
		1.96以上	2100mg(7錠)	14錠/分2		