

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉
〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	腓・胆道-2 GEM/S-1	総投与時間：約40分
申請医：木場 崇剛Dr	催吐性リスク：軽度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ゲムシタビン	div	1000mg/m ²	D1,8	3週間
	S-1：D1-D14				
	1日2回、朝夕食後に服用				
	体表面積(m ²)	1回用量(錠数)	1日錠数		
	1.25未満	40mg(2錠)	4錠/分2		
	1.25以上1.5未満	50mg(2 or 3錠)	5錠/分2(3-0-2)		
	1.5以上	60mg(3錠)	6錠/分2		
対象(適応癌種)	進行・再発膵臓癌、胆道癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日		
Rp1	デキサート 6.6mg(適宜増減) 5%ブドウ糖 50mL	div (ケモセーフ)	500 mL/hr			D1,8		
Rp2	ゲムシタビン【 mg/body】 5%ブドウ糖 100mL		200 mL/hr				1000 mg/m ²	mg/body
Rp3	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr					
Rp4	エスワンタイホウ(20)【 錠/分2 (- 0 -) 朝・夕食後 ※D1のTS-1は当日の夕食後より服用	1日2回、朝夕食後に服用				D1-14		
	体表面積(m ²)	1回用量(錠数)	1日錠数					
	1.25未満	40mg(2錠)	4錠/分2					
	1.25以上1.5未満	50mg(2 or 3錠)	5錠/分2(3-0-2)					
	1.5以上	60mg(3錠)	6錠/分2					