

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	腓・胆道-7 nal-IRI + 5-FU/LV	総投与時間：約4時間 + 46時間
申請医：竹内 伸司Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	オニバイド(nal-IRI)	div	70mg/m <sup>2</sup>	D1	2週間
	レボホリナート(I-LV)		200mg/m <sup>2</sup>		
	5-FU	46hr ci	2400mg/m <sup>2</sup>	D1-3	
対象(適応癌種)	がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な腓癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg(適宜増減) アロキシ注 1V 5%ブドウ糖液 100mL	div (ケモセーフ)	250 mL/hr			D1
Rp2	オニバイド【 mg/body】 5%ブドウ糖液【500- mL】= 500mL ※オニバイドは4.3mg/mL		330 mL/hr	70 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr			
Rp4	(抗がん剤側 バッグスパイクをつける) レボホリナート【 mg/body】 5%ブドウ糖液 250mL		125 mL/hr	200 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp5	5-FU【 mg/body】 生食【 mL】 デキサート 1.65mg(1A) (SV-2.5使用)	ci	46hr	2400 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	