

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉
〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	乳腺-2 ハーセプチン +Weekly PAC	総投与時間：約45分-130分
申請医：木場 崇剛Dr	催吐性リスク：軽度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ハーセプチン	div	初回 8mg/kg 2回目～ 6mg/kg	D1	3週間
	パクリタキセル(PAC)		80mg/m ²		
対象(適応癌種)	HER2過剰発現の乳癌				

パクリタキセル単独投与时

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 6.6mg (適宜漸減) ポララミン 1A シメチジン 1A 5%ブドウ糖 50mL	div (ケモセーフ フィルター付 き)	500 mL/hr			D1など
Rp2	5%ブドウ糖 100mL		200 mL/hr			
Rp3	パクリタキセル【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		250 mL/hr	80 mg/m ²	mg/body	
Rp4	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr			

ハーセプチン・パクリタキセル併用时

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度 mL/hr	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 6.6mg (適宜漸減) ポララミン 1A シメチジン 1A 生食 50mL	div (ケモセーフ フィルター付 き)	500 mL/hr			D1など
Rp2	ハーセプチン【初回 mg/body】 ハーセプチン【2回目～ mg/body】 生食 250mL		500 (初回170) mL/hr			
Rp3	パクリタキセル【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		250 mL/hr	80 mg/m ²	mg/body	
Rp4	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr			

ハーセプチン単独時

	薬品名 【 投与量 】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	生食 50mL	div (ルート・三 活)	500 mL/hr			D1など
Rp2	ハーセプチン【初回 mg/body】 ハーセプチン【2回目～ mg/body】 生食 250mL		500 (初回170) mL/hr	初回 8mg/kg 2回目～ 6mg/kg	初回： 2回目～： mg/body	
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr			