

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	乳腺-3 ハーセプチン/DOC	総投与時間：約2時間
申請医：島崎 猛夫Dr	催吐性リスク：軽度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ハーセプチン	div	初回 8mg/kg 2回目～ 6mg/kg	D1	3週間
	ドセタキセル(DOC)		60mg/m <sup>2</sup> (最大70mg/m <sup>2</sup> )		
対象(適応癌種)	HER2過剰発現が確認された乳癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 6.6mg(適宜増減) シメチジン注 1A(適宜追加) ポララミン注 1A(適宜追加) 5%ブドウ糖 100mL	div (ケモセーフ)	250 mL/hr			D1
Rp2	ドセタキセル【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		250 mL/hr	60mg/m <sup>2</sup> (最大70mg/m <sup>2</sup> )	mg/body	
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr			
Rp4	ハーセプチン【初回 mg/body】 ハーセプチン【2回目～ mg/body】 生食 250mL		500 (初回170) mL/hr	初回 8mg/kg 2回目～ 6mg/kg	初回: 2回目～:  mg/body	
Rp5	生食 50mL		500 mL/hr			