

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	乳腺-4 ハーセプチン+TC	総投与時間：約3~4時間
申請医：井口 雅史Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ハーセプチン	div	初回 8mg/kg 2回目~ 6mg/kg	D1	3週間
	エンドキサン(CPA)		600mg/m ²		
	ドセタキセル(DOC)		75mg/m ²		
対象(適応癌種)	HER2陽性の乳癌における術後化学療法				
支持療法	<ul style="list-style-type: none"> ・ジールスタ皮下注(D2に投与) ・デカドロン錠0.5mg 8錠/朝・昼食後(D2-3に内服) ・ロキソプロフェン錠60mg 1錠 ・レバミピド錠100mg 1錠/疼痛時、1日3回まで ・プリンペラン錠5mg 1錠/吐き気時 				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日	
Rp1	デキサート 9.9mg アロキシ 1A 5%ブドウ糖液 100mL	div (ケモセーフ)	250 mL/hr			D1	
Rp2	ドセタキセル【 mg/body】 5%ブドウ糖液 250mL			75 mg/m ²	mg/body		
Rp3	(側管)ファシールを使用して調製する エンドキサン【 mg/body】 生食 250mL			600 mg/m ²	mg/body		
Rp4	生食 50mL						
Rp5	ハーセプチン【初回 mg/body】 ハーセプチン【2回目~ mg/body】 生食 250mL			500 (初回170) mL/hr	初回 8mg/kg 2回目~ 6mg/kg		初回: 2回目~: mg/body
Rp6	生食 50mL			500 mL/hr			