

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉  
〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	乳腺-6 ハーセプチン/VNR	総投与時間：約40分-70分
申請医：矢野 聖二Dr	催吐性リスク：最小度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ハーセプチン	div	初回 8mg/kg 2回目～ 6mg/kg	D1	3週間
	ビンレルビン(VNR)		25mg/m <sup>2</sup>	D1,8	
対象(適応癌種)	HER2過剰発現が確認された再発・転移性乳癌				

## ハーセプチン・ビンレルビン併用時

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	生食 50mL	div (ケモセーフ)	500 mL/hr			D1
Rp2	ハーセプチン【初回 mg/body】 ハーセプチン【2回目～ mg/body】 生食 250mL		500 (初回170) mL/hr	初回 8mg/kg 2回目～ 6mg/kg	初回: 2回目～: mg/body	
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr			
Rp4	ビンレルビン【 mg/body】 生食 50mL		全開で	25 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp5	デキサート 3.3mg/body ソルデム3A 200mL		500 mL/hr			

## ビンレルビン単独時

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	生食 50mL	div (ケモセーフ)	500 mL/hr			D8
Rp2	ビンレルビン【 mg/body】 生食 50mL		全開で	25 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp3	デキサート 3.3mg/body ソルデム3A 200mL		500 mL/hr			