

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	乳腺-7 ハーセプチン/ハラヴェン	総投与時間：約20分-120分
申請医：矢野 聖二Dr	催吐性リスク：軽度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ハーセプチン	div	初回 8mg/kg 2回目～ 6mg/kg	D1	3週間
	ハラヴェン		1.4mg/m ²	D1,8	
対象(適応癌種)	HER2過剰発現が確認された再発・転移性乳癌				

ハーセプチン・ハラヴェン併用時

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 6.6mg (適宜減量) 生食 50mL	div (ケモセーフ)	500 mL/hr			D1
Rp2	ハラヴェン【 mg/body】 生食 50mL		全開で	1.4 mg/m ²	mg/body	
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr			
Rp4	ハーセプチン【初回 mg/body】 ハーセプチン【2回目～ mg/body】 生食 250mL		500 (初回170) mL/hr	初回 8mg/kg 2回目～ 6mg/kg	初回： 2回目～： mg/body	
Rp5	生食 50mL		500 mL/hr			

ハラヴェン単独時

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 6.6mg (適宜減量) 生食 50mL	div (ケモセーフ)	500 mL/hr			D8
Rp2	ハラヴェン【 mg/body】 生食 50mL		全開で	1.4 mg/m ²	mg/body	
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr			

ハーセプチン/ハラヴェン