

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉
〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	乳腺-8 ハーセプチン/GEM	総投与時間：約40分-90分
申請医：矢野 聖二Dr	催吐性リスク：最小度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ハーセプチン	div	初回 8mg/kg 2回目～ 6mg/kg	D1	3週間
	ゲムシタビン(GEM)		1250mg/m ²		
対象(適応癌種)	HER2過剰発現が確認された再発・転移性乳癌				

ハーセプチン・ゲムシタビン併用時

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	5%ブドウ糖 50mL デキサート 6.6mg	div (ケモセーフ)	500 mL/hr			D1
Rp2	ゲムシタビン【 mg/body】 5%ブドウ糖 100mL		200 mL/hr			
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr	初回 8mg/kg 2回目～ 6mg/kg		
Rp4	ハーセプチン【初回 mg/body】 ハーセプチン【2回目～ mg/body】 生食 250mL		500 (初回170) mL/hr			
Rp5	生食 50mL		500 mL/hr			

ゲムシタビン単独時

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 6.6mg (適宜増減) 5%ブドウ糖 50mL	div (ケモセーフ)	500 mL/hr			D8
Rp2	ゲムシタビン【 mg/body】 5%ブドウ糖 100mL		200 mL/hr			
Rp3	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr			