

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	乳腺-12 パージェタ/ハーセプチン/DOC	総投与時間：約2時間40分
申請医：矢野 聖二Dr	催吐性リスク：軽度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	パージェタ	div	初回 840mg 2回目～ 420mg	D1	3週毎
	ハーセプチン		初回 8mg/kg 2回目～ 6mg/kg		
	ドセタキセル(DOC)		75mg/m <sup>2</sup>		
対象(適応癌種)	①HER2陽性の手術不能又は再発乳癌 ②HER2陽性の乳癌における術前薬物療法 ③HER2陽性の乳癌における術後薬物療法				

## 1クール目 day1

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	生食 50mL	div (ルート三活)	500 mL/hr			D1
Rp2	パージェタ【840mg/body】 生食 250mL		250 mL/hr			
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr			

## 1クール目 day2

Rp1	生食 50mL	div (ケモセーフ)	500 mL/hr			D2
Rp2	ハーセプチン【初回 mg/body】 生食 250mL		167 mL/hr	8mg/kg	mg/body	
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr			
Rp4	デキサート 6.6mg(適宜増減) 5%ブドウ糖 100mL					
Rp5	ドセタキセル【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		250 mL/hr	75mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp6	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr			

パージェタ/ハーセプチン/DOC

## 2クール目以降

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	生食 50mL	div (ケモセーフ)	500 mL/hr	/		D1
Rp2	パージェタ【420mg/body】 生食 250mL					
Rp3	生食 50mL					
Rp4	ハーセプチン【2回目～ mg/body】 生食 250mL					
Rp5	生食 50mL		/			
Rp6	デキサート 6.6mg(適宜増減) 5%ブドウ糖 100mL					
Rp7	ドセタキセル【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		250 mL/hr	75mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp8	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr	/		

## 維持療法(パージェタ・ハーセプチン2剤投与)

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	生食 50mL	div (ルート三活)	500 mL/hr	/		D1
Rp2	パージェタ【420mg/body】 生食 250mL		500 mL/hr			
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr			
Rp4	ハーセプチン【2回目～ mg/body】 生食 250mL		500 mL/hr	6mg/kg	mg/body	
Rp5	生食 50mL		500 mL/hr	/		