

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	乳腺-18 AC	総投与時間：約2時間
申請医：衣斐 寛倫Dr	催吐性リスク：高度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	エンドキサン(CPA)	div	600mg/m <sup>2</sup>	D1	3週間
	ドキシソルピシン(DXR)		60mg/m <sup>2</sup>		
対象(適応癌種)	乳癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg(適宜減量) アロキシ 1A 5%ブドウ糖液 100mL <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">アプレピタント使用</span>	div (ケモセーフ)	250 mL/hr			D1
Rp2	ドキシソルピシン【 mg/body】 5%ブドウ糖液 100mL		500 mL/hr	60 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp3	(側管)ファシールを使用して調製する エンドキサン【 mg/body】 生食 250mL		250 mL/hr	600 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp4	生食 50mL		500 mL/hr			