

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉
〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	乳腺-19 dose-dense AC	総投与時間：約2時間
申請医：井口 雅史Dr	催吐性リスク：高度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	エンドキサン(CPA)	div	600mg/m ²	D1	2週間
	ドキシソルビシン(DXR)		60mg/m ²		
対象(適応癌種)	乳癌				
支持療法	<ul style="list-style-type: none"> ・ジーラスタ皮下注(D2に投与) ・デカドロン錠0.5mg 16錠/朝・昼食後(D2-4に内服) ・ファモチジン錠20mg 2錠/朝・夕食後(D2-4に内服) ・ロキソプロフェン錠60mg 1錠 ・レバミピド錠100mg 1錠/疼痛時、1日3回まで ・ドンペリン錠10mg 1錠/吐き気時 ・酸化マグネシウム錠330mg 3錠/毎食後、排便状況に応じて適宜調節可 ・センノシド錠12mg 1錠/便秘時、1回2錠まで服用可 ・アズノールうがい液 1日3回 				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg(適宜減量) アロキシ 1A 生食 100mL アプレピタント使用	div (ケモセーフ)	250 mL/hr			D1
Rp2	ドキシソルビシン【 mg/body】 5%ブドウ糖液 100mL		500 mL/hr	60 mg/m ²	mg/body	
Rp3	(側管)ケモセーフを使用して調製する エンドキサン【 mg/body】 生食 250mL		250 mL/hr	600 mg/m ²	mg/body	
Rp4	生食 50mL		500 mL/hr			