

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	卵巣-11 GEM/CBDCA	総投与時間：約1.7時間
申請医：衣斐 寛倫Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ゲムシタビン(GEM)	div	1000mg/m <sup>2</sup>	D1,8	3週間
	カルボプラチン(CBDCA)		①AUC=5 ②AUC=4	D1	
対象(適応癌種)	①非小細胞肺癌 ②卵巣癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg(適宜増減) グラニセトロン 1A 5%ブドウ糖液 100mL	div (ケモセーフ)	250 mL/hr			D1
Rp2	ゲムシタビン【 mg/body】 5%ブドウ糖液 100mL		200 mL/hr			
Rp3	カルボプラチン【 mg/body】 5%ブドウ糖液 250mL		250 mL/hr	①AUC=5 ②AUC=4	mg/body	
Rp4	5%ブドウ糖液 50mL		500 mL/hr			

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 6.6mg(適宜増減) 5%ブドウ糖 50mL	div (ケモセーフ)	500 mL/hr			D8
Rp2	ゲムシタビン【 mg/body】 5%ブドウ糖 100mL		200 mL/hr			
Rp3	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr			