

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

| | | |
|-------------|------------|----------------|
| 治療レジメン名： | 肺-30 TC | 総投与時間：約4.5時間 |
| 申請医：矢野 聖二Dr | 催吐性リスク：中等度 | 最新登録日：2023年 5月 |

| | 薬剤名 | 投与方法 | 投与量 | 投与日 | クール | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|-----|-----|----|---------|-------|-----|-------------------------|---|---------|-------------------------|-----|----------------------------|--------------|-----------|-----|----------------------------|-----|------------|----|---------|-------|-----------|
| | パクリタキセル(PAC) | div | ①200mg/m ² ②③175mg/m ² | D1 | 3週間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カルボプラチン(CBDCA) | | AUC=6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象(適応癌種) | ①非小細胞肺癌 ②卵巣癌 ③子宮体癌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投与基準 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>基準</th> <th>項目</th> <th>基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WBC</td> <td>3000 /mm³以上</td> <td>GOT/GPT</td> <td>150IU/L未満</td> </tr> <tr> <td>Neu</td> <td>1500 /mm³以上</td> <td>T-Bil</td> <td>3mg/dL未満</td> </tr> <tr> <td>Plt</td> <td>75,000 /mm³ 以上</td> <td>CCr</td> <td>80mL/min未満</td> </tr> <tr> <td>Hb</td> <td>8g/dL以上</td> <td>非血液毒性</td> <td>Grade 2以下</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 項目 | 基準 | 項目 | 基準 | WBC | 3000 /mm ³ 以上 | GOT/GPT | 150IU/L未満 | Neu | 1500 /mm ³ 以上 | T-Bil | 3mg/dL未満 | Plt | 75,000 /mm ³ 以上 | CCr | 80mL/min未満 | Hb | 8g/dL以上 | 非血液毒性 | Grade 2以下 |
| 項目 | 基準 | 項目 | 基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WBC | 3000 /mm ³ 以上 | GOT/GPT | 150IU/L未満 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neu | 1500 /mm ³ 以上 | T-Bil | 3mg/dL未満 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plt | 75,000 /mm ³ 以上 | CCr | 80mL/min未満 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hb | 8g/dL以上 | 非血液毒性 | Grade 2以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減量基準 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>有害事象の程度</th> <th>次回投与量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WBC</td> <td>1000/mm³未満</td> <td rowspan="3">パクリタキセル：175mg/m² → 150mg/m² → 125mg/m² カルボプラチン：AUC 6 → 5 → 4</td> </tr> <tr> <td>Neu</td> <td>500 /mm³ 未満</td> </tr> <tr> <td>Plt</td> <td>50,000 /mm³ 未満</td> </tr> <tr> <td>肝障害 非血液毒性</td> <td>Grade 3以上</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 項目 | 有害事象の程度 | 次回投与量 | WBC | 1000/mm ³ 未満 | パクリタキセル：175mg/m ² → 150mg/m ² → 125mg/m ² カルボプラチン：AUC 6 → 5 → 4 | Neu | 500 /mm ³ 未満 | Plt | 50,000 /mm ³ 未満 | 肝障害 非血液毒性 | Grade 3以上 | | | | | | | | |
| 項目 | 有害事象の程度 | 次回投与量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WBC | 1000/mm ³ 未満 | パクリタキセル：175mg/m ² → 150mg/m ² → 125mg/m ² カルボプラチン：AUC 6 → 5 → 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neu | 500 /mm ³ 未満 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plt | 50,000 /mm ³ 未満 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肝障害 非血液毒性 | Grade 3以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な副作用 | <p>パクリタキセル：骨髄抑制、末梢神経障害、関節痛、筋肉痛、悪心・嘔吐、脱毛、発熱、肝機能障害、腎機能障害</p> <p>カルボプラチン：骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、発熱、肝障害</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参考文献 | <p>癌化学療法ハンドブック2012(メディカルレビュー社)：p68-70 Schiller JH et al. : N Engl J Med 346, 2002 : 92-98</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 治療予定期間: 年 月 日 より の間 | | | | 薬剤師 | 薬剤師 | |
|---------------------|--|-------------------------------|--------------|------------------------------------|---------|-----|
| 処方医師 : | | 適応癌種 : | | | | |
| 患者ID : | 年齢 : | 備考 : | 身長: cm | 体表面積 : | | |
| 患者氏名 : | | | 体重: kg | m ² | | |
| 薬品名 【 投与量 】 | | 投与方法 | 投与速度 | 標準投与量 | 計算量 | 投与日 |
| Rp1 | デキサート 16.5mg (適宜漸減) ポララミン 1A シメチジン 1A グラニセトロン 1A 5%ブドウ糖 50mL | div (ケモセーフ フィルター付 き) | 500 mL/hr | | | D1 |
| Rp2 | 5%ブドウ糖 100mL | | 200 mL/hr | | | |
| Rp3 | パクリタキセル【 mg/body】 5%ブドウ糖 500mL | | 167 mL/hr | ①200 ②③175 mg/m ² | mg/body | |
| Rp4 | カルボプラチン【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL | | 250 mL/hr | AUC=6 | mg/body | |
| Rp5 | 5%ブドウ糖 50mL | | 500 mL/hr | | | |