

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉
 〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	肺-8 PEM/CBDCA+キイトルーダ(導入)	総投与時間：約2時間
申請医：谷本 梓Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	アリムタ(PEM)	div	500mg/m ²	D1	3週間
	カルボプラチン(CBDCA)		AUC=5		
	キイトルーダ		200mg		
対象(適応癌種)	切除不能な進行・再発の非扁平上皮非小細胞肺癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg(適宜増減) アロキシ 1A 生食 50mL	div (ケモ セーフフィ ルター付 き)	500 mL/hr			D1
Rp2	生食50mL					
Rp3	キイトルーダ【200mg/body】 生食100mL		200 mL/hr	200 mg/body		
Rp4	生食 50mL		500 mL/hr			
Rp5	アリムタ【 mg/body】 生食 100mL ※100mg/Vは4.2mL, 500mg/Vは20mL の生食でそれぞれ溶解する。					
Rp6	カルボプラチン【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		250 mL/hr	AUC=5	mg/body	
Rp7	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr			