

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉  
 〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	肺-9 PEM/CBDCA+キイトルーダ(維持)	総投与時間：約1時間
申請医：谷本 梓Dr	催吐性リスク：軽度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	アリムタ(PEM)	div	500mg/m <sup>2</sup>	D1	3週間
	キイトルーダ		200mg		
対象(適応癌種)	切除不能な進行・再発の非扁平上皮非小細胞肺癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日	
Rp1	デキサート 6.6mg(適宜増減) 生食 50mL	div (ケモ セーフフィ ルター付 き)	500 mL/hr			D1	
Rp2	生食50mL						
Rp3	キイトルーダ【200mg/body】 生食100mL		200 mL/hr	200 mg/body			
Rp4	生食 50mL		500 mL/hr				
Rp5	アリムタ【 mg/body】 生食 100mL ※100mg/Vは4.2mL, 500mg/Vは20mL の生食でそれぞれ溶解する。						500 mg/m <sup>2</sup>
Rp6	生食 50mL						