

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	肺-12 CDDP/CPT	総投与時間：約7時間
申請医：鈴木 千晶 Dr	催吐性リスク：高度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	シスプラチン(CDDP)	div	60mg/m <sup>2</sup>	D1	4週間
	イリノテカン(CPT-11)		60mg/m <sup>2</sup>	D1,8,15	
対象(適応癌種)	小細胞肺癌(神経内分泌癌(NEC)には適応外申請を行い実施可)				

## イリノテカン・シスプラチン併用時

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg(適宜減量) アロキシ 1V マグネゾール 0.5A ソルデム3A 500mL <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">アプレピタント使用</span>	div (ケモセーフ)	500 mL/hr			D1
Rp2	イリノテカン【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		250 mL/hr	60 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp3	マンニトール 300mL					
Rp4	シスプラチン【 mg/body】 生食【 mL】 (Total 500mL)		60 mg/m <sup>2</sup>	mg/body		
Rp5	生食 500mL					
Rp6	ソルデム3A 500mL					
Rp7	プリンペラン 1A ソルデム3A 500mL					

## イリノテカン単独投与时

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg (適宜増減) グラニセトロン 1A 5%ブドウ糖 100mL	div (ケモセーフ)	250 mL/hr			D8,15
Rp2	イリノテカン【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL			60 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp3	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr			