

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉  
〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	肺-17 CBDCA/S-1	総投与時間：約1.5時間
申請医：衣輩 寛倫Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
カルボプラチン(CBDCA)	div	AUC=5	D1	3週間
S-1 : D1-D14				
1日2回、朝夕食後に服用				
体表面積(m <sup>2</sup> )	1回用量(錠数)	1日錠数		
1.25未満	40mg(2錠)	4錠/分2		
1.25以上1.5未満	50mg(2 or 3錠)	5錠/分2(3-0-2)		
1.5以上	60mg(3錠)	6錠/分2		
対象(適応癌種)	非小細胞肺癌			

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg(適宜増減) グラニセトロン 1A 5%ブドウ糖液 100mL	div (ケモセーフ)	250 mL/hr			D1
Rp2	カルボプラチン【 mg/body】 5%ブドウ糖液 250mL		250 mL/hr			
Rp3	5%ブドウ糖液 50mL		500 mL/hr			
Rp4	エスワンタイホウ(20)【 】mg/分2 ( - 0 - ) 朝・夕食後 ※D1のS-1は当日の夕食後より服用	1日2回、朝夕食後に服用				D1-14
	体表面積(m <sup>2</sup> )	1回用量(錠数)	1日錠数			
	1.25未満	40mg(2錠)	4錠/分2			
	1.25以上1.5未満	50mg(2 or 3錠)	5錠/分2(3-0-2)			
	1.5以上	60mg(3錠)	6錠/分2			