

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	MDS-1 ビダーザ	総投与時間：約0.8時間
申請医：青島 敬二Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ビダーザ	div または s.c	75mg/m <sup>2</sup>	D1-7	4週間
対象(適応癌種)	骨髄異形成症候群				

〈点滴静注で施行する場合〉

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg (適宜増減) グラニセトロン 1A 生食 100mL	div	200 mL/hr			D1-7
Rp2	ビダーザ【 mg/body】 注射用水(溶解用) 20mL 生食 50mL ※1バイアルにつき注射用水10mLを注入し溶解する。溶解液の必要量を生食50mLに混合する。		300 mL/hr			
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr			

〈皮下投与で施行する場合〉

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg (適宜増減) グラニセトロン 1A 生食 100mL	div	200 mL/hr			D1-7
Rp2	ビダーザ【 mg/body】 注射用水(溶解用) 20mL ※1バイアルにつき注射用水4mLを注入し懸濁させる。均一な懸濁液の必要量をシリンジで計り取る。	s.c	緩徐に			