

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉
〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	MM-2 VMP	総投与時間：約 5.5時間
申請医：青島 敬二Dr	催吐性リスク：最小度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ベルケイド	i.v または s.c	1.3mg/m ²	D1,8,15,22	5週間
	アルケラン(L-PAM)	p.o	9mg/m ²	D1-4	
	プレドニン(PSL)		60mg/m ²		
対象(適応癌種)	多発性骨髄腫				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	メイロン7% 2A ソルデム1 500mL	div	90 mL/hr			
Rp2	<静注で施行する場合> ベルケイド注【 mg/body】 溶解用生食【 mL】 ※生食20mLより1Vにつき3mLで溶解 フラッシュ用生食 20mL	iv	ワンシヨット	1.3 mg/m ²	mg/body	D1,8,15,22
	<皮下投与で施行する場合> ベルケイド注【 mg/body】 溶解用生食【 mL】 ※生食20mLより1Vにつき1.2mLで溶解	s.c	ゆっくりと			
Rp3	アルケラン(2)【 】T/朝食前	p.o		9mg/m ²	mg/body	D1-4
Rp4	プレドニン(5)【 】T/朝・昼食後			60mg/m ²	mg/body	