

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	MM-3 VRD	総投与時間：皮下注または静注
申請医：青島 敬二Dr	催吐性リスク：最小度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ベルケイド	i.v または s.c	1.3mg/m ²	D1,4,8,11	3週間
	レブラミド	p.o	25mg/body	D1-14	
	レナデックス(DEX)		40mg/body	D1,8,15	
対象(適応癌種)	多発性骨髄腫				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	<静注で施行する場合> ベルケイド【 mg/body】 溶解用生食【 mL】 ※生食20mLより1Vにつき3mLで溶解 フラッシュ用生食 20mL	iv	ワンショット	1.3 mg/m ²		D1,4,8,11
	<皮下投与で施行する場合> ベルケイド【 mg/body】 溶解用生食【 mL】 ※生食20mLより1Vにつき1.2mLで溶解	s.c	ゆっくりと			
Rp2	レブラミド(5)【 】cap/朝食後	p.o		25mg/body	mg/body	D1-14
Rp3	レナデックス(4)【 】T/朝食後			40mg/body	mg/body	D1, 8, 15