

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	NHL-1 リツキサン	総投与時間：約5.5時間
申請医：青島 敬二Dr	催吐性リスク：最小度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	リツキサン	div	375mg/m ²	D1	1週間
対象(適応癌種)	CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫、慢性特発性血小板減少性紫斑病				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	5%ブドウ糖液 100mL	div	ゆっくり	375 mg/m ² mg/body		D1
Rp2	リツキサン【 mg】 5%ブドウ糖液【 mL】 Total 100mL		50→100→ 150→200 mL/hr (十分観察しながら1時間毎に 速度をあげる。 問題なく施行で きた場合は次 回より 100mL/hrでの 開始可能)			
Rp3	リツキサン【 mg】 5%ブドウ糖液【 mL】 Total 500m					
Rp4	カロナール(200) 2T d-クロルフェニラミン酸塩徐放錠(6) 1T / リツキサン開始30分前に服用 1回分					

リツキサン

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉
〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	NHL-1 リツキシマブBS	総投与時間：約5.5時間
申請医：青島 敬二Dr	催吐性リスク：最小度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	リツキシマブBS	div	375mg/m ²	D1	1週間
対象(適応癌種)	CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	5%ブドウ糖液 100mL	div	ゆっくり			D1
Rp2	リツキシマブBS【mg】 5%ブドウ糖液【mL】 Total 100mL		50→100→ 150→200 mL/hr (十分観察しながら1時間毎に速度をあげる。問題なく施行できた場合は次回より100mL/hrでの開始可能)			
Rp3	リツキシマブBS【mg】 5%ブドウ糖液【mL】 Total 500m					
Rp4	カロナール(200) 2T d-クロルフェニラミン酸塩徐放錠(6) 1T / リツキシマブBS開始30分前に服用 1回分					