

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉  
〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	NHL-4 R-CVP	総投与時間：
申請医：青島 敬二Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
/	リツキシマブBS	div	375mg/m <sup>2</sup>	D1	3-4 週間
	エンドキサン(CPA)		750mg/m <sup>2</sup>	D2	
	オンコビン(VCR)		1.4mg/m <sup>2</sup> (MAX 2mg/bodyまで)		
	プレドニン(PSL)	p.o	60mg/m <sup>2</sup> または 100mg/body	D2-6	
対象(適応癌種)	CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	5%ブドウ糖液 100mL	div	ゆっくり			D1
Rp2	リツキシマブBS【 mg】 5%ブドウ糖液【 mL】 Total 100mL		50→100→ 150→200 mL/hr (十分観察しながら1時間毎に 速度をあげる。 問題なく施行で きた場合は次 回より 100mL/hrでの 開始可能)	375 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp3	リツキシマブBS【 mg】 5%ブドウ糖液【 mL】 Total 500m					
Rp4	カロナール(200) 2T d-クロルフェニラミン酸塩徐放錠(6) 1T / リツキシマブBS開始30分前に服用 1回分					

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	エンドキサン【mg/body】 生食 500mL	div (ケモセーフ 使用)	170 mL/hr	750 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	D2
Rp2	オンコビン【mg/body】 生食 50mL		100 mL/hr	1.4 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp3	生食 50mL(オンコビン後フラッシュ用)		500 mL/hr			
Rp4	メイロン7% 2A ソルデム1 500mL ※2クール目以降はメイロンなしとする (補液は適宜増減)		68 mL/hr			
Rp5	メイロン7% 2A ソルデム1 500mL					
Rp7	ソルデム1 500mL					
Rp8	グラニセトロン 1A 1日2回 朝、夕 生食 100mL (適宜減量)		200 mL/hr			
Rp9	ラシックス 1A		iv			
Rp9	プレドニン(5)【】T/分2( - - 0 ) 朝・昼食後	p.o		60mg/m <sup>2</sup> または 100mg/body	mg/body	D2-6