

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉
〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	NHL-7 CHOP	総投与時間：約16-24時間
申請医：青島 敬二Dr	催吐性リスク：高度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	エンドキサン(CPA)	div	750mg/m ²	D1	3-4 週間
	ドキシソルビシン(DXR)		50mg/m ²		
	オンコビン(VCR)		1.4mg/m ² (MAX 2mg/bodyまで)		
	プレドニン(PSL)	p.o	60mg/m ² または 100mg/body	D1-5	
対象(適応癌種)	非ホジキンリンパ腫				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	エンドキサン【 mg/body】 生食 500mL	div (ケモセーフ 使用)	170 mL/hr	750 mg/m ²	mg/body	D1
Rp2	ドキシソルビシン【 mg/body】 5%ブドウ糖液 100mL		200 mL/hr	50 mg/m ²	mg/body	
Rp3	オンコビン【 mg/body】 生食 50mL		100 mL/hr	1.4 mg/m ²	mg/body	
Rp4	生食 50mL(オンコビン後フラッシュ用)		500 mL/hr			
Rp5	メイロン7% 2A ソルデム1 500mL ※2クール目以降はメイロンなしとする (補液は適宜増減)		68 mL/hr			
Rp6	メイロン7% 2A ソルデム1 500mL					
Rp7	ソルデム1 500mL					
Rp8	グラニセトロン 1A 1日2回 朝、夕 生食 100mL (適宜減量)		200 mL/hr			
Rp9	ラシックス 1A		iv			
Rp10	プレドニン(5)【 T/分2(- - 0)】 朝・昼食後		p.o		60mg/m ² または 100mg/body	

CHOP