

化学療法治療レジメン

申請書 (主治医) → (薬剤部) → (化学療法委員会)
 計画書 (主治医) → (薬剤部)

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	悪性黒色腫-3 ダカルバジン (5日間分割投与法)	総投与時間：約1時間30分
申請医：佐藤 成樹Dr	催吐性リスク：高度	最新登録日：2022年 6月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ダカルバジン(DTIC)	div	250mg/m ²	D1-5	3~4週間
対象(適応癌種)	悪性黒色腫				
コメント	・ダカルバジンによる血管痛予防のため、点滴経路全般を遮光して投与する。				
投与基準	臨床試験などに記載なし				
減量基準	臨床試験などに記載なし				
主な副作用	ダカルバジン：悪心・嘔吐、血管痛、肝機能障害、食欲不振				
参考文献	ダカルバジン添付文書 がん化学療法ワークシート第4版 p166~170 エビデンスに基づいた癌化学療法ハンドブック2012 p470~472				

治療予定期間： 年 月 日 より の間				薬剤師	薬剤師
処方医師：		適応癌種：			
患者ID：	年齢：	備考：	身長： cm	体表面積：	
患者氏名：			体重： kg	m ²	
薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1 グラニセトロン 1A 生食 100mL ※ステロイド、NK1受容体拮抗薬は状態に応じて適宜使用可	div (ケモセーフ)	250 mL/hr	250mg/m ²		D1-5
Rp2 ダカルバジン【 mg/body】 溶解用注射用水(mL) 1Vにつき 10mL 生食 100mL ※点滴瓶・ルートとも遮光必要		100 mL/hr			
Rp3 生食 50mL		500 mL/hr			