

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	膵・胆道-5 FOLFIRINOX	総投与時間：約4.5時間 + 46時間
申請医：渡辺 美智夫Dr	催吐性リスク：高度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	オキサリプラチン(L-OHP)	div	85mg/m <sup>2</sup>	D1	2週間
	イリノテカン(CPT-11)		180mg/m <sup>2</sup>		
	レボホリナート(I-LV)		200mg/m <sup>2</sup>		
	5-FU		400mg/m <sup>2</sup>		
	5-FU	46hr ci	2400mg/m <sup>2</sup>	D1-3	
対象(適応癌種)	治癒切除不能な膵癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg(適宜減量) グラニセトロン 1A 5%ブドウ糖液 100mL アプレピタント使用	div (ケモセーフ)	250 mL/hr			D1
Rp2	オキサリプラチン【 mg/body】 5%ブドウ糖液 250mL		125 mL/hr			
Rp3	(側管) レボホリナート【 mg/body】 5%ブドウ糖液 250mL		125 mL/hr	200 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp4	イリノテカン【 mg/body】 5%ブドウ糖液 250mL ※Rp3(レボホリナート)投与30分後より開始し、Rp3と並行して投与		167 mL/hr	180 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp5	5-FU【 mg/body】 5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr	400 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp6	5-FU【 mg/body】 生食【 mL】 デキサート 1.65mg(1A) (SV-2.5使用)	ci	46hr	2400 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	